

Papillon au Lötschental / Fantaisie d'un amateur

par Emmanuel de BROS, Lic. Jur.

Bâle et Montana

Pauvres Lépidoptères du Lötschental ! Vous ne soupçonniez pas le danger mortel qui vous menaçait, ce radieux samedi matin, 2 juillet 1949, lorsqu'en queue du long serpent murithien rampant de Goppenstein vers Ferden, une sinistre filoché noire se déploya soudain au poing de Papillon ! Heureusement pour vous, le souffle de ce Papillon-là était court, ses lunettes souvent embuées et ses lourdes godasses avaient peine à suivre vos ailes montagnardes.

Rien d'étonnant donc si, en fin de compte, sur les légions qui animaient la vallée ce jour-là, une centaine de victimes seulement se trouvent maintenant dûment piquées, étalées, étiquetées, déterminées, classées et embaumées dans les cadres du méchant Papillon. « C'est encore ça de trop ! » s'écrieront les charmantes amies des sciences naturelles qui protestèrent contre le massacre, ou peut-être même Pierre Grellet : ne se trouva-t-il pas coincé plus de 20 minutes dans la colonne de marche, juste derrière ce meurtricide instrument, comme dit certain collègue belge.

Minute Papillon ! Que penser alors des gloires de la lépidoptérologie, les Courvoisier, Fruhstorfer, et Vorbrodt surtout ? Dans un travail fort bien fait, malheureusement presque introuvable à l'heure actuelle¹, ce dernier établit la liste consciencieuse des lépidoptères lötschards capturés par lui de 1909 à 1926, lors de plus de 20 séjours et excursions, ainsi que par MM. Bigler, Burghold, Oester, Schlier et Steck (de Berne), Courvoisier (de Bâle), Fruhstorfer (Genève) et v. d. Goltz (Coblence). Ce Catalogue de plus de 30 pages n'énumère pas moins de 453 espèces différentes, très exactement : 133 Rhopalocères, 10 Sphinx, 22 Bombyx, 100 Noctuelles, 122 Géomètres, 48 Arctiides, Syntomides, Zygènes, Psychés, Sésies et Hépiales, 18 Microlépidoptères (mites, teignes, etc.) enfin. Il précise bien que sauf pour les Rhopalocères (papillons de jour), le tableau de chasse est en-

¹ • Beiträge zur Kenntnis der Gross-Schmetterlingsfauna des Lötschentales dans Internationale Entomologische Zeitschrift 20, 3, p. 337, 1er janvier 1927.

core très incomplet. Pourtant, avec 435 espèces sur les 1220 que compte la « Faune des Macrolépidoptères du Valais » de Favre et Wullschlegel (Schaffhouse 1899) et sur les 1500 environ que Vorbrodt relève dans ses « Schmetterlinge der Schweiz » (Berne 1914), la faune entomologique du Lötschental est déjà fort riche et intéressante. Tranquillisez-vous donc, amis murithiens, il reste encore des papillons dans la vallée !

Le splendide itinéraire choisi par notre Président, décrit ailleurs dans ce Bulletin, fut malheureusement parcouru à une allure bien trop rapide pour permettre aux fervents du filets de « travailler » sérieusement. Ils durent se borner à prélever un simple échantillonnage : 48 espèces de macrolépidoptères et 3 « micros » pour mon compte. Ce coup de sonde confirme entièrement la publication de Vorbrodt : sauf quelques détails signalés ci-après, les captures et observations faites se trouvent déjà relevées dans son catalogue : espèces, époque d'apparition, répartition géographique. Ce que nous avons pris et vu nous incite pourtant à retourner au Lötschental : il reste certainement encore des trouvailles à faire, surtout parmi les nocturnes et les micro-lépidoptères — sans parler du très moderne problème des races pour les diurnes.

Comment ne pas être pris d'une véritable nostalgie de chasseur en se remémorant toutes les commodités matérielles réunies au Lötschental, à Fafleralp en particulier, où une profusion d'électricité attire quantités de belles Noctuelles et Géomètres alpines directement « à domicile » ? Nous sommes en effet là à proximité des zones les plus riches : entre Wiler (1421 m) et Tennmatt (1472 m), Ried (1509 m) et Eisten (1585 m), vers Kühmatt (1635 m) ; parmi les alpages, la Lauchernalp (2122 m) a la préférence de Vorbrodt, pour sa faune comme pour la vue.

Avant d'immortaliser les victimes de cette expédition par une nécrologie en bonne forme, précisons que leur identification exacte a été établie avec l'aide de collectionneurs expérimentés, M. le Dr Schmidlin (Berne) pour les Hespérides et MM. Imhof (Bâle) pour les Géomètres, Ls Weber (Genève) pour les Zygènes et Chs Fischer (Mulhouse) pour les « micros », que je remercie ici de leur grande amabilité. Pour plus de commodité, j'emploierai encore la nomenclature et la systématique de Vorbrodt ; malgré les immenses progrès (entendre : bouleversements !) accomplis dans ces domaines depuis son époque, il reste en effet le guide de la majorité des collectionneurs-amateurs suisses.

Voici donc pour finir, avec les excuses de Papillon et ses regrets de ne point disposer de noms plus parlants, plus dignes de ses victimes, le tableau de chasse.

Quelques Lépidoptères du Lötschental :

2.7.49 Goppenstein (1216 m.) - Fafleralp (1795 m.)

- P. apollo L. f. valesiacus Fruhst. ♀
- P. mnemosyne L. ♂
- A. cardamines L. ♀
- L. sinapis L. ♂
- C. phicomone Esp. ♀
- M. phoebe Knoch.
- M. didyma O.
- C. aëlle Hbn. ♂ entre Goppenstein et Ferden (Vorbrodtt n'en a pris que 2 ex., les 6-10. 8.)
- C. alciphron Rott. f. gordius Sulzer ♂
- L. medon Esp. f. alloüs Hb.
- L. bellargus Rott. ♂
- L. corydon Poda. ♂
- P. palaemon Pall. (à 1400 m.)
- A. thaumas Hufn. ♂
- C. altheae Hbn. ♂ (Vorbrodtt : isolé)
- Z. purpuralis Brunnich
- Pyrausta aerealis Hb. f. opacalis Hb.

Grundsee (1879 m.)

- C. phicomone Esp. ♂
- E. tyndarus Esp. ♂
- L. idas L. (f. haefelfingeri Brt. ?) ♂
- L. aqueata Hbn. (Vorbrodtt : Kippel et Eisten)
- L. montanata Schiff.
- Scoparia sudetica z. (ne figure pas dans la liste Vorbrodtt)

Fafleralp (1795 m.), à la lampe

- A. simplonia H.-G.
- A. exclamationis L.
- M. serena F. (ne figure pas dans la liste Vorbrodtt !)
- D. proxima Hb. ♀ (Vorbrodtt : Kippel, Eisten)
- M. imbecilla F.
- A. incanata L.
- A. praeformata Hbn.
- Lar. aptata Hbn.
- Lar. caesiata Lang.
- Lar. nebulata Sebaldd nombreux ex. (Vorbrodtt : 1 ex. le 1.8 ; mais salicata commune !)

Gn. glaucinaria Hb. ♂

Gn. ambiguata Dup. ♂ (Vorbrodt : quelques ex. 4.7.-9.8. Eisten)

Gn. myrtillata Schalen ♂♀ f. canaria Hb. et limosaria Hb (ce dernier plus abondant ; pas mentionné par Vorbrodt)

Hyponomeuta evonymellus L. (ne figure pas dans la liste Vorbrodt)

3.7.49 *Fafleralp* (1795 m.) — *Kummenalp* (2075 m.) : « Höhenweg »

C. hyale L. f. alfacariensis Ribbe ♂

C. palaeno L. f. europomene O. ♂

M. pseudathalia Rev. ♂

M. dictynna Esp.

E. pharte Hb. ♂ (ne figure pas dans la liste Vorbrodt)

E. ceto Hb. ♂♀

L. idas L. (f. haefelfingeri Brt.?) ♂♀

L. medon Esp. f. alloüs Hb.

L. chiron Rott. ♀ (rare selon la liste Vorbrodt)

L. optilete Kn. f. cyparissus Hb. ♂♀ (Vorbrodt : 1 seul ex., le 9.8. à Langgletscher)

L. bellargus Rott. ♂♀

H. alveus Hbn. ♂

H. maillardi H.-G. (Vorbrodt : seulement fin juillet)

Lar. caesiata Lang.

Lar. nebulata Sebaldt

Gn. myrtillata Schalen f. limosaria Hb. ♀

S. lineata Scop.

S. aurita Esp. f. ramosa Fabr. ♂

P. plantaginis L. f. hospita Schiff. ♂

P. geryon Hb. f. chrysocephala Nick.

Z. achilleae Esp. (Vorbrodt : isolé seulement)
